

Léčení – metodika na <https://www.beedol.cz/leceni/>

+ <https://www.beedol.cz/cely-rok/>

Nátěr plodu v předjaří

Nátěr plodu je jediné ošetření, které zasahuje roztoče i pod víčky buněk. K plné účinnosti ošetření je třeba následně provést fumigaci Varidolem, která zlikviduje i roztoče přítomné na dospělých včelách, včetně roztočů rezistentních na tau-fluvalinát.

Při spadu nad 3.

Ošetření se provádí pouze v nezbytných situacích, co nejdříve v předjaří, nejpozději do 15.4.




2 Nakapejte 5 kapek M-1 AER do 50 ml pitné vody.



3 Rostok řádně rozmíchejte!




4 K nátěru použijte plochý štětec, pro každé stanoviště použijte jiný.



5 Natírejte pomalými tahy, aby emulze víčky dobře prolnula. Víčka se musí lesknout.



6 Natíráme pouze plodová víčka. Nátěrem nesmíme potřísnit včely, otevřený plod, zásoby ani úl.



7 Aby nedošlo k předávkování, je možné natřít pouze 10 dm² plodu v jednom včelstvu!

8

Proto léčbu provádíme brzy z jara, co nejdříve po oznámení výsledků vyšetření zimní měli. Pokud již nátěr plodu není možný, přistoupíme k ošetření například *Formidolem* či *VarroMedem*.



9

9 Ošetření nátěrem plodu je nutné doplnit následnou fumigací přípravkem *Varidol*, čímž zasáhneme roztoče na dospělých včelách, včetně roztočů rezistentních na tau-fluvalinát.

Přípravek:

M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro roztok k léčebnému ošetření včel

Kontaktní přípravek pro léčení včel proti varroáze

Pouze na veterinární předpis